

**Prospect: Informații pentru utilizator****Antinevralgic Forte comprimate**  
acid acetilsalicilic/paracetamol/cafeină

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

Luați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 3-4 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

**Ce găsiți în acest prospect:**

1. Ce este Antinevralgic Forte și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați Antinevralgic Forte
3. Cum să luați Antinevralgic Forte
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Antinevralgic Forte
6. Conținutul ambalajului și alte informații

**1. Ce este Antinevralgic Forte și pentru ce se utilizează**

Antinevralgic Forte este un analgezic, reduce febra și este un medicament cu efect antiinflamator (antiinflamator nesteroidian/analgezic).

Antinevralgic Forte conține trei substanțe active: paracetamol, acid acetilsalicilic și cafeină.

**Paracetamolul** ameliorează durerea și reduce febra. **Acidul acetilsalicilic** ameliorează durerea, reduce febra și are efecte antiinflamatorii. **Cafeina** contracarează simptomele de oboseală, promovează motivația și performanța mentală. Scurtează timpul până la începutul acțiunii acidului acetilsalicilic și paracetamolului și, de asemenea, potențează efectele lor.

Această combinație de substanțe active este mai eficientă decât utilizarea substanțelor separat (paracetamol sau acid acetilsalicilic sau cafeină) sau a combinației duble (paracetamol și acid acetilsalicilic). Această combinație scade cantitatea de analgezice necesară.

**Antinevralgic Forte este destinat utilizării la adulți și adolescenți cu vârsta de 12 ani și mai mult, pentru a trata:**

- cefaleea din episoadele de migrenă cu sau fără aură (simptome ce preced atacul migrenos și durează de la câteva minute până la o oră)
- cefaleea de tip tensional

**O cefalee (durere de cap) de tip migrenă** poate fi însoțită de alte simptome, cum sunt senzație sau stare de rău (greață sau vărsături), și sensibilitate la lumină și sunete. Episoadele de migrenă pot fi „anunțate” de aură (o senzație de avertizare care implică, de obicei, distorsiuni vizuale, cum sunt lumină puternică intermitentă, linii în zig-zag, puncte luminoase sau valuri).

**O cefalee de tip tensional** este cel mai comun tip de durere de cap. Durerea este adesea descrisă ca o presiune constantă, ca și cum capul ar fi strâns într-o menghină și este prezentă frecvent, în același timp, pe ambele părți ale capului.

Dacă după 3-4 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

## **2. Ce trebuie să știți înainte să luați Antinevralgic Forte**

### **Nu luați Antinevralgic Forte dacă:**

- sunteți alergic la paracetamol, acid acetilsalicilic, cafeină sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la punctul 6), salicilați sau alte medicamente antiinflamatoare nesteroidiene (medicamente utilizate pentru tratarea durerii, a febrei sau a inflamației),
- aveți ulcer gastric sau intestinal,
- aveți probleme severe cu inima, sau cu ficatul,
- aveți predispoziție crescută la sângerări,
- utilizați 15 mg metotrexat pe săptămână sau mai mult (un medicament folosit la tratarea poliartritei reumatoide, psoriazisului sau diferitelor tipuri de cancer),
- sunteți în ultimele trei luni de sarcină,
- sau nu administrați copilului dumneavoastră, dacă are vârsta sub 12 ani,
- aveți vârsta sub 17 ani și aveți în același timp febră (vezi punctul 3, "Utilizarea la copii și adolescenți").

### **Atenționări și precauții**

Înainte să luați Antinevralgic Forte, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă:

- aveți astm bronșic (dificultăți la respirație), „febra fânului”, umflare a mucoasei nazale (polipi nazali) sau aveți alte simptome alergice,
- ați avut vreodată ulcer gastric sau intestinal,
- aveți sau ați avut probleme gastrice sau intestinale, sângerări (ați avut vărsături și acestea au conținut sânge sau particule care seamănă cu zațul de cafea, ați avut scaune cu sânge sau scaune moi de culoare neagră) sau perforații (găuri în intestin);
- aveți tulburări ale funcției rinichilor, inimii sau ficatului (de exemplu consum cronic de alcool etilic sau inflamare a ficatului),
- aveți o afecțiune ereditară denumită deficit de glucozo-6-fosfat-dehidrogenază sau sindromul Gilbert,
- aveți o glandă tiroidă prea activă (hipertiroidism),
- veți fi supus unei operații sau unei alte intervenții chirurgicale (incluzând de exemplu extracția unui dinte),
- aveți gută (la unii pacienți folosirea de acid acetilsalicilic poate declanșa o criză de gută),
- luați orice alte medicamente (vezi pct. „Antinevralgic Forte împreună cu alte medicamente”)
- aveți mastocitoză (tulburare a sistemului imunitar).

Dacă în timp ce luați acest medicament reapar sau se agravează semnele unei infecții, adresați-vă imediat unui medic.

Administrarea analgezicelor cu regularitate poate duce la scăderea permanentă a funcției rinichilor, cu riscul de insuficiență a rinichilor (nefropatie analgezică).

Antinevralgic Forte poate afecta rezultatele unor analize. Dacă efectuați analize de sânge, urină sau alte analize de laborator, spuneți personalului medical că luați Antinevralgic Forte.

### **Evitați să luați deseori analgezice dacă suferiți de:**

- diabet zaharat (diabet),
- alcoolism,

- deshidratare (provocată de diaree, vreme foarte caldă, antrenamente fizice excesive cu transpirații severe),
- scăderea cronică a tensiunii arteriale,
- leziuni severe,
- sau dacă luați un tratament pentru reumatism.

### **Utilizarea de lungă durată/utilizare necorespunzătoare**

Utilizarea de lungă durată, în doze mari, a Antinevralgic Forte, fără a fi în concordanță cu recomandările, poate cauza dureri de cap, care nu pot fi tratate cu doze crescute din acest medicament. Dacă sunteți în această situație, nu trebuie să continuați administrarea acestui medicament fără să vă adresați medicului pentru recomandări.

### **Antinevralgic Forte împreună cu alte medicamente**

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente.

Nu luați Antinevralgic Forte dacă utilizați și alte analgezice sau medicamente pentru scăderea febrei care conțin paracetamol sau acid acetilsalicilic.

Adresați-vă medicului înainte să luați acest medicament, în special dacă utilizați/vi se administrează oricare dintre următoarele medicamente:

- metotrexat (utilizat pentru tratamentul poliartritei reumatoide, psoriasisului sau anumitor tipuri de cancer, vezi pct. „Nu luați Antinevralgic Forte dacă:”).
- medicamente utilizate pentru a preveni formarea cheagurilor de sânge (de exemplu derivați cumarinici – warfarină, heparină),
- medicamente antiinflamatoare nesteroidiene (utilizate pentru a reduce durerea, a scădea febra sau inflamația),
- medicamente utilizate pentru tratamentul diabetului zaharat,
- medicamente care vă ajută să dormiți,
- medicamente utilizate pentru tratamentul epilepsiei (de exemplu acid valproic, lamotrigină, fenobarbital, fenitoină, carbamazepină, topiramat),
- medicamente utilizate la tratamentul depresiei sau a altor probleme psihice (fluvoxamină sau alți inhibitori selectivi ai recaptării serotoninei, litiu, clozapină),
- medicamente pentru tratarea gutei (probenecid),
- medicamente diuretice (pentru creșterea eliminării de urină),
- medicamente pentru tratamentul problemelor inimii (digoxină),
- medicamente utilizate pentru tratamentul tensiunii arteriale crescute,
- unele antibiotice sau medicamente antifungice (cloramfenicol, rifampicină, ciprofloxacina, norfloxacina, flucloxacilina),
- hormoni steroidieni (corticosteroizi),
- medicamente care scad golirea stomacului (propantelină),
- medicamente utilizate pentru a trata greața și vărsăturile (metoclopramid, domperidonă).
- decongestionante, medicamente pentru răceală și gripă care conțin fenilpropanolamină sau substanțe din grupul efedrinei,
- medicamente utilizate pentru tratamentul astmului bronșic și al dificultăților de respirație (teofilină),
- medicamente anti-ulceroase (cimetidină),
- tiroxină și simpatomimetice,
- contraceptive orale,
- medicamente utilizate pentru tratamentul alcoolismului (disulfiram),
- zidovudină (utilizată în tratamentul infecției cu HIV),
- izoniazidă (utilizată pentru tratamentul tuberculozei),
- medicamente utilizate pentru scăderea concentrației colesterolului din sânge (colestiramină),
- medicamente utilizate în cazul respingerii organului transplantat, după transplant (ciclosporină, tacrolimus),
- alte medicamente care pot avea efect toxic asupra ficatului,

- vaccinul împotriva varicelei (vărsatului de vânt), pe o perioadă de 6 săptămâni după ce administrarea acestuia,
- medicamente utilizate pentru tratamentul glaucomului (acetazolamidă).

### **Antinevralgic Forte împreună cu alimente, băuturi și alcool**

Dacă în timpul administrării de Antinevralgic Forte aveți indigestie, luați doza în timpul meselor. Consumul de alcool trebuie evitat pe durata tratamentului cu acest medicament.

Scădeți administrarea de medicamente și consumul de alimente sau băuturi care conțin cafeină în timp ce utilizați Antinevralgic Forte. Prea multă cafeină poate determina nervozitate, iritabilitate și ritm crescut al bătăilor inimii.

### **Sarcina, alăptarea și fertilitatea**

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Nu trebuie să utilizați Antinevralgic Forte dacă sunteți gravidă în mai mult de 6 luni de sarcină.

Dacă sunteți gravidă în mai puțin de 6 luni, adresați-vă medicului înainte de a lua acest medicament.

Nu utilizați acest medicament, decât dacă vă recomandă explicit medicul dumneavoastră.

Antinevralgic Forte nu trebuie să fie utilizat în timpul alăptării pentru o perioadă lungă de timp sau în doze mari.

Medicamentul aparține unui grup de medicamente care pot să scadă fertilitatea la femei. Acest efect este reversibil la oprirea tratamentului.

### **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

Nu se cunoaște ca administrarea de Antinevralgic Forte să afecteze capacitatea de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

### **Antinevralgic Forte conține lactoză**

Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveți o intoleranță la unele categorii de glucide, întrebați-l înainte de a lua acest medicament.

## **3. Cum să luați Antinevralgic Forte**

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul, dacă nu sunteți sigur.

Cu excepția cazului în care v-a fost altfel prescris de către medicul dumneavoastră, doza recomandată pentru adulți și adolescenți cu vârsta de 12 ani și peste este de 1-2 comprimate luate la intervale de cel puțin 4 ore, până la de trei ori pe zi, dacă este necesar.

- Doza maximă zilnică nu trebuie să depășească 6 comprimate în orice perioadă de 24 ore.
- Comprimatele trebuie dizolvate într-o cantitate mică de lichid sau înghițite întregi (fără a le mesteca) cu o cantitate suficientă de lichid.
- Nu luați acest medicament pentru mai mult de 3 - 4 zile, cu excepția cazului în care v-a fost recomandat de către medicul dumneavoastră, medicul dentist sau farmacist.

### **Utilizarea la pacienții cu funcție alterată a rinichilor sau ficatului**

Adresați-vă unui medic pentru ajustarea dozei înainte de a începe să luați acest medicament. După examinarea stării sănătății dumneavoastră, medicul vă poate recomanda reducerea dozei sau mărirea la mai mult de 4 ore a intervalului dintre dozele individuale.

### **Utilizarea la copii și adolescenți**

Acest medicament este destinat pentru utilizare la copii și adolescenți cu vârsta de 12 ani și mai mare. Antinevralgic Forte nu trebuie utilizat pentru a trata copiii și adolescenții cu vârsta sub 17 ani, având boli care produc febră (de exemplu vărsat de vânt).

Dacă un copil sau adolescent prezintă următoarele simptome în același timp cu o boală care produce febră, iar simptomele persistă pentru o perioadă lungă de timp, **adresați-vă medicului dumneavoastră sau mergeți imediat la un spital:**

- vărsături;
- dureri de cap;
- pierderea conștienței.

Acestea pot fi semne ale sindromului Reye, o boală foarte rară, dar, în unele cazuri letală, care necesită tratament medical imediat.

#### **Dacă luați mai mult Antinevralgic Forte decât trebuie**

Cereți asistență medicală de urgență imediat ce ați luat mai mult Antinevralgic Forte decât v-a fost prescris sau dacă un copil a luat accidental acest medicament. Cereți asistență medicală de urgență chiar dacă dumneavoastră (sau copilul dumneavoastră) vă simțiți bine, deoarece există riscul unei afectări întârziate grave a ficatului.

#### **Dacă uitați să luați Antinevralgic Forte**

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată. Luați următoarea doză imediat ce vă aduceți aminte, dar păstrați un interval de administrare de cel puțin 4 ore între doze. Nu luați mai mult de 6 comprimate într-un interval de 24 ore.

#### **Dacă încetați să luați Antinevralgic Forte**

Dacă încetați brusc să luați acest medicament după o perioadă lungă de administrare și după administrarea în doze mari care nu sunt în conformitate cu instrucțiunile de utilizare (abuziv) pot apărea dureri de cap, precum și oboseală, dureri musculare, nervozitate și simptome vegetative de exemplu transpirații, greață, creșterea ritmului bătăilor inimii). Aceste simptome dispar în câteva zile. Până la dispariția completă a simptomelor, analgezicele nu ar trebui să fie luate din nou. Reluarea administrării de analgezice trebuie să înceapă numai după ce discutați cu medicul dumneavoastră.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

## **4. Reacții adverse posibile**

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

#### **Solicitați asistență medicală de urgență dacă prezentați una dintre următoarele reacții adverse:**

- **șoc anafilactic** (o reacție alergică foarte gravă cu simptome precum amețeli, pierderea conștienței, probleme cu respirația, umflarea limbii sau căilor respiratorii, colorarea în albastru a pielii etc.)
- **angioedem** (umflare bruscă a țesutului de sub suprafața pielii)
- reapariția sau agravarea **semnelor unei infecții**
- foarte rar au fost raportate **reacții grave pe piele**. Aceste reacții pot implica ulcere la nivelul gurii, gâtului, nasului, organelor genitale și conjunctivită (ochi roșii și umflați). Erupțiile grave pe piele sunt adesea precedate de febră, dureri de cap, dureri la nivelul corpului (simptome asemănătoare gripei). Erupția poate progresa până la apariția de vezicule și descuamare a pielii pe suprafețe extinse.

Următoarea listă de reacții adverse include, de asemenea și reacțiile adverse întâlnite la pacienții care au luat tratament cu doze mari, de lungă durată, cu acid acetilsalicilic (una din componentele active ale Antinevralgic Forte) pentru a trata simptomele de reumatism. Probabilitatea de apariție a tulburărilor gastro-intestinale este mai mare la administrarea de doze mai mari de Antinevralgic Forte.

#### **Frecvente (pot afecta până la 1 din 10 persoane )**

- nervozitate, amețeli

- durere abdominală, durere de stomac, indigestie, senzație de rău (greață), stare de rău (vărsături), arsuri la nivelul pieptului;
- sângerări oculte (sânge prezent în materiile fecale, care nu este vizibil cu ochiul liber, dar care este detectat prin teste de laborator).

**Mai puțin frecvente** (pot afecta până la 1 din 100 persoane)

- ritm crescut și neregulat al inimii (palpitații)
- reacții alergice pe piele (hipersensibilitate) (cum ar fi mâncărime sau urticarie);
- diaree.

**Rare** (pot afecta până la 1 din 1000 persoane)

- senzație de neliniște (agitație), tremurături (tremor), senzație de amețeală sau de "învârtire" (vertij), stare de rău (stare generală de rău);
- accelerarea bătăilor inimii (tahicardie);
- reacție de hipersensibilitate, care poate include senzație de lipsă de aer, scăderea tensiunii arteriale, șoc, umflare, roșeață a pielii sau reacții grave pe piele, inclusiv eritem polimorf;
- inflamație a capătului de jos al tubului care duce la stomac (esofagită), ulcere în tubul digestiv;
- transpirație excesivă (hiperhidroză);
- sângerare care poate duce, eventual, la anemie (o scădere a numărului normal de celule roșii din sânge, cu simptome, cum sunt stare generală de rău, culoare albă a pielii, somnolență etc);
- modificare a funcției ficatului, care poate duce la modificări ale analizelor de sânge.

**Foarte rare** (pot afecta până la 1 din 10000 persoane)

- senzație de nervozitate, tremurături sau transpirație, acestea pot fi semne de scădere a concentrației zahărului din sânge (hipoglicemie);
- perforație (gaură) sau ruptură în tractul digestiv;
- insuficiență a funcționării rinichilor (insuficiență renală);
- modificări ale numărului de celule ale sângelui (semnele includ pete purpurii, rotunde, fără durere, de mărimea unui vârf de ac pe piele, uneori grupate pe zone mai mari, sângerare a gingiilor, sângerări nazale sau vânătăi, la traumatisme minore, stare generală de rău, slăbiciune sau risc crescut de infecție);
- urticarie, dificultăți la respirație sau respirație șuierătoare (bronhospasm), la pacienții care au reacții alergice la medicamente pentru tratarea durerii, febrei și inflamației.

**Cu frecvență necunoscută** (frecvența nu poate fi estimată din datele disponibile)

- tulburări ale sângelui (modificări ale numărului de globule din sânge, de exemplu număr scăzut de globule roșii și albe sau de plachete. Tulburările sângelui pot să se manifeste sub formă de sângerări în piele - pete purpurii, punctiforme, rotunde și nedureroase pe piele, care uneori se unesc în pete mai mari, sângerări ale gingiilor, sângerări nazale sau apariția de vânătăi după traumatisme minore, creștere a susceptibilității la infecții, oboseală, dureri de cap, timp de sângerare prelungit), scăderea producției de globule sanguine la nivelul măduvei osoase;
- dureri de cap, somnolență, confuzie;
- afectare a vederii, afectare a auzului sau apariția de zgomote în urechi;
- inflamație la nivelul stomacului intestinului subțire sau gros;
- inflamație a ficatului, care poate duce la insuficiență acută a funcțiilor ficatului, leziuni ale ficatului;
- inflamația de lungă durată a ficatului, care provoacă îngălbenirea pielii și ochilor (hepatită cronică),
- insuficiență renală;
- erupție fixă;
- sângerare în interiorul craniului, poate fi letală, în special la vârstnici;
- dificultăți la respirație;
- inflamația vaselor de sânge (vasculită);
- inflamația acută a pancreasului în contextual unei reacții alergice;
- lichid în plămâni (la utilizarea de lungă durată a Antinevralgic Forte și în condițiile unei reacții de hipersensibilitate).

În anumite cazuri, a fost descrisă o agravare a inflamațiilor (umflării) cauzate de infecții ca fiind în strânsă legătură cu folosirea unor medicamente împotriva durerii, febrei și inflamației (AINS, un grup care include, de asemenea și Antinevralgic Forte).

Cafeina din acest medicament poate conduce la insomnie.

### **Raportarea reacțiilor adverse**

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse posibile nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.anm.ro/>. Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

## **5. Cum se păstrează Antinevralgic Forte**

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original pentru a fi protejat de umiditate.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

## **6. Conținutul ambalajului și alte informații**

### **Ce conține Antinevralgic Forte**

- Substanțele active sunt acid acetilsalicilic, paracetamol și cafeină. Un comprimat conține acid acetilsalicilic 250 mg, paracetamol 250 mg și cafeină 50 mg
- Celelalte componente sunt: lactoză monohidrat, amidon de porumb, dioxid de siliciu coloidal anhidru și acid stearic.

### **Cum arată Antinevralgic Forte și conținutul ambalajului**

Comprimatele de Antinevralgic Forte sunt oblongi, biconvexe, de culoare albă până la aproape albă, cu dimensiunile 16 x 8 mm, fără linie mediană.

Comprimatele sunt ambalate în blistere din PVC-PVdC/Al sau PVC-PVdC/Al-hârtie. Ambalajul secundar este o cutie din carton.

Mărimi de ambalaj: 10, 12, 20, 24 comprimate.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

### **Deținătorul autorizației de punere pe piață**

Zentiva, k.s.

U kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37, Praga 10

Republica Cehă

### **Fabricantul**

Zentiva S.A.

B-dul. Theodor Pallady, nr. 50, sector 3, București

România

**Acest medicament este autorizat în Statele Membre ale Spațiului Economic European sub următoarele denumiri comerciale:** Migralgin în Republica Cehă și Republica Slovacă, Doloversa în Germania, Antinevralgic Forte în România, Paralen în Norvegia și Ibuem în Slovenia.

**Acest prospect a fost revizuit în Martie 2016.**